


# PEYVƏNDİN İSTİFADƏ QAYDALARI

## Pfizer/Biontech BNT162B2

### PEYVƏNDİN DONUNUN AÇILMASI



1

#### Peyvəndin donunu açın.

Soyuducuda ( $+2^{\circ}\text{C}$  -  $+8^{\circ}\text{C}$ ) və ya otaq temperaturunda ( $\leq +30^{\circ}\text{C}$ ) peyvəndin donunu açın. Açılmamış flakonlar soyuducuda 1 aya, otaq temperaturunda isə 2 saata qədər saxlanıla bilər.



2

#### Flakonun temperaturunun otaq temperaturuna çatmasını gözləyin.



3

#### Flakonu 10 dəfə ehmalca başı aşağı çevirin.

Flakonu çalxalamamaq olmaz!


**Əgər flakonu çalxalamışınızsa, onu istifadə etməyin!**

4

#### Peyvəndin rənginə fikir verin.

Donu açılmış peyvənd ağ və ya aqtəhər rəngdə, qeyri-şəffaf hissəciklərdən ibarət ola bilər.


### PEYVƏNDİN HƏLL EDİLMƏSİ



5

#### Peyvəndi həll edin.

Peyvənd flakonunun tıxacını və həlleddicinin ampul başlığını antiseptik tamponla silin. **21G** (və ya daha nazik) iynə və **2 - 5 ml-lıq** şprislə peyvənd flakonuna **1.8 ml 0,9%-lı sodium xlorid** məhlulu əlavə edin.



6

#### Flakondakı təzyiqi tənzimləyin.

Iynəni çıxarmadan flakondan şprisə **1.8 ml** hava çəkin.



7

#### Flakonu 10 dəfə ehmalca başı aşağı çevirin.

Flakonu çalxalamamaq olmaz! Peyvəndin rəngi aqtəhər olacaqdır. Əgər peyvənd rəngsiz olarsa və ya içində bərk hissəciklər müşahidə edilərsə, onu istifadə etməyin.


8

#### Flakonunun üzərində həll edilmə tarixi və saatını qeyd edin.

Həll edilmiş peyvəndi  $+2^{\circ}\text{C}$  -  $+30^{\circ}\text{C}$ -də saxlanılmaqla 6 saat ərzində istifadə edin.

**Flakonu günəş altına qoymaq və yenidən dondurmaq olmaz!**

### PEYVƏNDİN VURULMASI



9

#### Peyvəndi şprisə çəkin.

Peyvənd flakonunun tıxacını antiseptik tamponla silin və **23G** (və ya daha nazik) iynə və **0,3 - 1 ml-lıq** şprislə **0,3 ml** peyvənd məhlulu yiğin.

Flakondakı qalıq peyvənd miqdarı **0,3 ml-dən** azdırırsa, flakonu atın. Bir dozanın yiğilması üçün müxtəlif flakonlardakı məhlullardan istifadə etmək olmaz!



10

#### Peyvəndi deltayabənzər əzələyə (bazunun yuxarı $1/3$ hissəsi) inyeksiya yolu ilə vurun.

#### Pasiyenti müşahidə edin.

**30 dəqiqə:** əvvəller peyvəndə və ya inyeksiya yolu ilə yeridilən dərmanlara allergik və ya hər hansı səbəbdən anafilaktik reaksiyası olmuş şəxsləri;

**15 dəqiqə:** digər şəxsləri